

Bioka Chitosan

KATEGÓRIE NEBEZPEČNOSTI:

Nie je žiadne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

P403 Uchovávať na dobre vetranom mieste. P220 Uchovávať mimo potravín. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P280 Noste ochranné rukavice ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

PRVÁ POMOC:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.

P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Prípravok rozmiešajte v malom množstve vody a potom vlejte do postrekovača naplneného vodou minimálne do 1/2 objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa musí miešať počas aplikácie.

KOMPATIBILITA:

Nemiešajte s látkami, ktoré majú pH vyššie ako 8. V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním.

SKLADOVANIE:

Uchovávať v originálnych obaloch, v suchých chladných miestnostiach, pri teplote +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV:

Obaly dobre vypláchnite vodou a odovzdajte ako plastový separovaný odpad.

Číslo šarže:
Objem balenia:
Dátum expirácie:

Uvedené na obale

VÝROBCA:

Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Šenkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

Základná látka EÚ No. 1107/2009

PRÍRODNÝ PRODUKT S ÚČINNOU LÁTKOU CHITOSAN

OBSAH

Chitosan 100 g/kg (10 % w/w) t.j. poly[β-(1,4)-D-glucosamine]

POPIS:

Bioka Chitosan je prírodný produkt s obsahom účinnej látky Chitosan, ktorá aktivuje odolnosť rastlín proti patogénnym hubám a baktériám. Chitosan zvyšuje množstvo enzýmov (chitinázy a peroxidázy), ktoré spúšťajú obranné mechanizmy, čím chráni rastliny pred patogénmi. Taktiež zlepšuje lignifikáciu bunkových stien, čo sa prejaví v odolnosti proti infekciám. Produkt zvyšuje výnos, rýchlosť klíčenia, rast i odolnosť ošetrovaných rastlín a má tiež pozitívny vplyv na symbiotické mykorízy. Okrem toho Chitosan pomáha rastlinám prekonávať abiotické stresové faktory, ako sú extrémne poveternostné podmienky - napríklad sucho. Produkt sa používa ako postrek, moridlo alebo stimulant rastu, ktorý je vhodný pre všetky rastliny, pôdy a semená.



OCHRANNÁ DOBA
0 dní

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Choroby	Dávka	Rastová fáza	Aplikácia (interval)
drobné ovocie	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	od vyvíjania listov, špičky listov nad svetlovlivným listom; prvé listy sa rozvíjajú (rbežná, egreš), prvé listy rozopreté (malina, čerešňa), obašovanie sa prvého listu (jodca) (BBCH 10) do vzniku plodu 90 % výnosov vyfomovaných (rbežná, egreš, jodca), lakmer (šedý) môže plody vidieť (malina, čerešňa) (BBCH 79)	max. 8 (14 dní)
viní hroznozod	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	od začiatku vývinu prvého listu (BBCH 10) do uzavretia stieho; obašovanie bobuľ sa naviazom dotyka (BBCH 79)	max. 8 (14 dní)
ovocné plodiny iné ako drobné ovocné plodiny a viní	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	od zelené špičky listov 10 mm nad svetlovlivným listom (jodca, egreš), od prvých listov separovaných, zelené špičky jemne ochované, začiatok rozvíjania listov (kôstkoviny) (BBCH 10) do veľkosti plodu 90 % z konečnej veľkosti (BBCH 79)	max. 8 (14 dní)
zelenina	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	vychádzanie: kľúčne listy na povrchu pôdy (BBCH 9) do veľkosti plodu dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79)	max. 8 (14 dní)
obilniny	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	vychádzanie: kľúčne listy na povrchu pôdy, na špičke kľúčnych listov vidieť list (BBCH 9) do neskorého mliečného zrelosti (BBCH 77)	max. 8 (14 dní)
koreniny	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	vychádzanie: kľúčne listy na povrchu pôdy (BBCH 9) do kalner kľúčne listy dosiahli konečnú veľkosť, všetky listy dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79)	max. 8 (14 dní)
krmoviny (plodiny na krmenie zvierat)	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	vychádzanie: kľúčne listy na povrchu pôdy (BBCH 9) do kalner kľúčne listy dosiahli konečnú veľkosť (BBCH 79)	max. 8 (14 dní)
tráva (trávny, pasienky, mätových tráv, (Lolium perenne) mätových trávok (Lolium multiflorum) trávna lúka (Poa pratensis) okrasné trávy (Lolium) zahŕňajúce aj ozdobnú trávu	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	vychádzanie: kľúčne listy (lignifikované rastliny - trávy), zviných listov cez povrch pôdy (rozdobina čínska) (BBCH 9) do plná zrelosti semen (trávy), prvé semená (rozdobina) (BBCH 89)	max. 8 (14 dní)
tráva (športoviská, golfové ihriská)	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	vychádzanie: kľúčne listy (lignifikované rastliny - trávy), zviných listov cez povrch pôdy (rozdobina čínska) (BBCH 9) do plná zrelosti semen (trávy), prvé semená (rozdobina) (BBCH 89)	max. 8 (14 dní)
okrasné rastliny (pryčes lesný, magnólia, príves Griffler, palamín, buk lesný, topol, hebe, silvka, gaultheria, trstina, javor, ruža, skalkin, ostružina, bránil, orgován, zlatovka, čučoriedka)	patogénne huby a baktérie	1-3 l/ha	špičky listov presahujú šupiny (BBCH 9) do plná zrelosti (BBCH 89)	max. 8 (14 dní)
ošetrovanie osiva: obilniny, zemiaky, cukrová repa	patogénne huby a baktérie	5-20 ml / 1 l vody	pred sejbou (BBCH 00)	1

