

Folicit

OZNAČENIE:

Nie je žiadne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRVÁ POMOC:

VŠEOBECNÉ POKYNY: V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. **PO NADÝCHANÍ:** Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia. **PRI ZASIAHNUTÍ POKOŽKY:** Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. **PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky, a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich. **PRI NÁHODNOM POŽITÍ:** Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. **»»»** Pri vyhľadani lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informácie z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 54 774 166.

SKLADOVANIE:

Uchovávať v originálnych obaloch, v suchých chladných miestnostiach, pri teplote +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. **Doba skladovateľnosti** v pôvodných neporušených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV:

Nepoužitý zvyšky produktu v pôvodnom obale, ako aj nepoužitý zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody vystriekajte na ošetrovanú pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných, ani povrchových vôd), alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

VÝROBCA:
Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Šenkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

Číslo šarže:
Objem balenia:
Dátum expirácie:

Uvedené na obale

Základná látka EÚ No. 1107/2009

**PRÍRODNÝ PRODUKT
ZLOŽENÝ ZO SÓJOVÉHO LECITÍNU
S VYSOKÝM OBSAHOM
PRÍRODNÝCH FOSFOGLYCERIDOV**

OBSAH

- Sójový lecitín (nie GMO)



OCHRANNÁ DOBA
0 dní



POPIS:

Folicit je prírodný produkt zložený zo sójového lecitínu, ktorý aktivuje fyziologické funkcie rastlín a tým stimuluje produkciu phytoalexínov. Okrem toho Folicit vytvára nepriaznivé prostredie pre rast húb a plesní. Produkt obsahuje špeciálny sójový lecitín s vysokým obsahom prírodných fosfoglyceridov, čím plodnám napomáha vyvinúť odolnosť voči nepriaznivým účinkom spojených z napadnutia hubami. Zmierňuje účinky bunkovej nekrózy listovej čepele, ktorá je spôsobená šírením hubových vlákien (hýf) v rastlinných bunkách. Po aplikácii Folicit-u sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá posilní bunkovú stenu rastlín a následne aktivuje obranný systém rastlín.

PLODINA	CHOROBA	KONC.	RASTOVÁ FÁZA (BBCH) POČET APLIKÁCIÍ / INTERVAL
OVOCNÉ STROMY: Jablon Broskyne	Múčnatka: <i>Podosphaera leucotricha</i> Kučeravost broskýň <i>Taphrina deformans</i>	0,2-0,5 %	Od BBCH03 do BBCH79 3–12 aplikácií / 5 dní
EGREŠE	Múčnatka: <i>Microsphaera grossulariae</i>	0,2-0,5 %	Od BBCH10 do BBCH85 2–4 aplikácie / 5 dní
ZELENINA: Uhorky Šalát hlávkový Valeriánka poľná Rajčiny	<i>Podosphaera xanthii</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Erysiphe polyphaga</i> <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Oidium neolycopersici</i>	0,1-0,4 %	Od BBCH10 do BBCH89 2–6 aplikácií / 5 dní 2 aplikácie / 7 dní 1 aplikácia 2–6 aplikácií / 7 dní
Čakanka štrbaková	<i>Alternaria cichorii</i>		2–6 aplikácií / 7 dní
KVETÝ: Ruže	Múčnatka a iné hubové ochorenia	0,1-0,3 %	Od BBCH10 do BBCH89 12 aplikácií / 5 dní
VINIČ	Múčnatka viniča: <i>Plasmopara viticola</i> , <i>Erysiphe necator</i>	0,2-0,5 %	Od BBCH11 do BBCH85 3–12 aplikácií / 5 dní

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Prípravok rozmiešajte v malom množstve vody a potom vlejte do postrekovača naplneného vodou minimálne do 1/2 objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa musí premiešať počas aplikácie. Aplikácia na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete.

KOMPATIBILITA:

Nemiešajte s produktmi so silnou alkalickou alebo kyslou reakciou. V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním.