

PowerOf-K

UFI: W800-H0YV-C007-TMSC

KATEGÓRIE NEBEZPEČNOSTI:

Kategória 2 (Skin Irrit. 2), Kategória 2 (Eye Irrit. 2),
Kategória 3 (STOT SE 3).

VYSTRAŽNÉ UPOZORNENIA:

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne
podráždenie očí.

H335 Môže spôsobiť
podráždenie dýchacích ciest.



POZOR

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / páru / aerosólov. **P264** Po manipulácii starostlivo umyť. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P271** Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. **P280** Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

PRVÁ POMOC:

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. **P305+P351+P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P312** Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.

P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **P403+P233** Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.

P501 Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / vnútroštátnymi / medzinárodnými predpismi.

SKLADOVANIE:

Uchovávať v originálnych obaloch, v suchých chladných miestnostiach, pri teplote +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. **Doba skladovateľnosti** v pôvodných neporušených obaloch je 4 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV:

Obaly dobre vypláchnite vodou a odovzdajte ako plastový separovaný odpad.



Číslo šarže:
Hmotnosť balenia:
Dátum expirácie:

Uvedené na obale

VÝROBCA:
Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Senkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny [PFC 1(C)(l)(b)(i)]

Registračné číslo: EU0089

BEZ CHLORIDOV - NÍZKY INDEX SOLI ZLEPŠENIE STRESOVEJ TOLERANCIE IHNEĎ DOSTUPNÝ DRASLÍK

OBSAH

- Min. 22,0 % oxidu draselného (K_2O) rozpustného vo vode, ako uhličitanu.
- Mikroživiny sú úplne rozpustné vo vode:
 - min. 0,08 % bór (B);
 - min. 0,001 % molybdén (Mo), ako sodnej soli.

ZLOŽKY

- Pôvodné látky a zmesi:
 - Uhličitan draselný CAS č. 584-08-7
 - Kyselina boritá CAS č. 10043-35-3
 - Molybdénan sodný dihydrát CAS č. 10102406

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- pH: 11,5-13,8



OCHRANNÁ DOBA
0 dní



POPIS:

PowerOf-K obsahuje draslík s mikroživinami (bór a molybdén) v roztoku. Draselné hnojivo s mikroživinami vplyva na veľkosť listovej plochy a tým aj na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách, ako aj na dozrievanie plodov, pretože ovplyvňuje metabolizmus cukrov. PowerOf-K zasahuje aj do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín v rastlinách. Vysoký obsah draslíka v hnojive aktivizuje rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách a tým pozitívne ovplyvňuje samotný vodný režim rastlín, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva, čo má za následok zvýšenie odolnosti rastliny voči mrazu.

PLODINA	APLIKÁCIA	INTERVALY A ODPORÚČANIA
Obilniny	0,5 - 1,0 %	Aplikujte na prvé vzniknuté listy alebo pred kvetom. Opakovať po opelení a následne po 14 až 21 dňoch.
Vinič	0,5 - 1,0 %	Aplikujte na prvé výhonky pre podporu rastu. Následne tesne pred kvetom a opäť po kvete, kedy je potrebný dusík.
Ovocné sady	0,5 - 1,2 %	Aplikujte prvýkrát vo fáze zelenej špičky alebo ružového púčika tesne pred rozkvitnutím. Aplikujte v 30-dňových intervaloch až do zberu pre lepší rast a dozrievanie plodu.
Záhradníctvo	0,5 - 1,0 %	Aplikujte po presadení, prebieрке alebo po vytvorení druhého fázeového listu. Použiť následne podľa požiadavky v 7 až 14-dňových intervaloch.
Trávy a pasienky	0,2 - 1,5 %	Aplikujte na jar pre dobrý rast, potom v mesačných intervaloch a opäť po zbere.
Kvety	0,1 %	Aplikácia každé dva týždne, alebo podľa potreby.

APLIKÁCIA:

Jeden liter hnojiva PowerOf-K roziedťe minimálne v 40 litroch vody. Draselné hnojivo je zásaditý materiál s pH okolo 12 a nemal by byť pridaný do kyslých materiálov. Pri zmiešavaní môže dochádzať k šumeniu zmesi. Aplikácia hnojiva na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete. V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný, pred skutočným zmiešaním. Všetky zmiešané zmesi použite v ten istý deň.

Použite len v prípade skutočnej potreby. Neprekročte dávkovanie. UPOZORNENIE!!! V prípade použitia koncentráta hrozí popálenie listov.