

GluFerm

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Uchovávať mimo dosahu detí. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite!

Prvá pomoc po nadýchaní: Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia. **Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:** postihnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožkypotom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. **Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:** Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich. **Prvá pomoc pri náhodnom požití:** Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevývolávajte zvracanie.

SKLADOVANIE:

Uchovávať v originálnych obaloch v suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 4 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV:

Obaly dobre vypláchnite vodou a odovzdajte ako plastový separovaný odpad.



Číslo šarže:
Objem balenia:
Dátum expirácie:

Uvedené na obale

VÝROBCA:
Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Senkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

TUHÉ ORGANICKÉ HNOJIVO [PFC 1(A) (I)]

Registračné číslo: EU1176

ZLEPŠENIE STRESOVEJ TOLERANCIE

Obsah:

celkový dusík (N): 3,5 % (m/m)
organický dusík (N): 3,5 % (m/m)
celkový oxid fosforečný (P 2 O 5): 1,0 % (m/m)
organický uhlík (C org): 47,5 % (m/m)

Vlastnosti:

sušina: 95,0 % (m/m)

vlhkosť: 5,0 % (m/m)

Zložky: kvasnicový extrakt CAS č. 84604-16-0, D-glukóza CAS č.: 50-99-7 / *pôvodné látky a zmesi.



POPIS:

GluFerm obsahuje extrakt z kvasníc (*Saccharomyces cerevisiae*) a glukózu. Kvasnice obsahujú veľké množstvo minerálov, vitamínov, bielkovín, beta-glukánov a manan-oligosacharidov. Hnojivo zvyšuje výnos, rast ošetrovaných rastlín a má tiež pozitívny vplyv na symbiotické mykorízy. Môže sa aplikovať priamo do pôdy, ako postrek na rastliny, alebo ako moridlo na semená. GluFerm zvyšuje účinnosť mednatých prípravkov ako aj prípravkov obsahujúcich baktérie a huby, má s nimi synergický efekt.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Postrek min. 200 l vody	Aplikácia do pôdy	Intervaly a odporúčania
Vinič	0,2-2,0 kg/ha	1,5-2,5 kg/ha	Opakovať ak je potrebné max. 6 krát v intervale 7 až 15 dní.
Ovocné sady	0,2-2,0 kg/ha	1,5-2,5 kg/ha	Opakovať ak je potrebné max. 6 krát v intervale 7 až 15 dní.
Zelenina	0,2-2,0 kg/ha	1,5-2,5 kg/ha	Opakovať ak je potrebné max. 6 krát v intervale 7 až 15 dní.
Poľné plodiny	0,2-2,0 kg/ha	1,5-2,5 kg/ha	Opakovať ak je potrebné max. 6 krát v intervale 7 až 15 dní.
Morenie	0,2-2,0 kg/tonu semena		

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A KOMPATIBILITA:

Aplikačnú dávku hnojiva rozmiešajte v malom množstve vody a vlejte do postrekovača naplneného vodou do polovice objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. Najlepšie výsledky sa získajú, ak sa dodrží odporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Produkt je kompatibilný s väčšinou hnojív, fungicídov a insekticídov.

