

Integrum Micro

POPIS:

Integrum Micro je roztok hnojiva, ktorý optimalizuje výživu rastlín mikroživinami. Mikroživiny sú vo forme glukonátov, ktoré sú v hnoji veľmi rýchlo absorbované a asimilované pletivami a koreňmi rastlín, čoho dôsledkom sú silnejšie a zdravšie rastliny. Hnojivo sa používa naviniť, ovocné stromy, obilniny, kukuricu, cukrovú repu, zemiaky, olejiny, strukoviny, lucernu a datelínu.

PRÍPRAVA POSTREKOVÉJ KVAPALINY: Pred použitím hnojivo vždy pretrepte. Pred samotnou aplikáciou overte reakciu rastlín na malej vzorke.

KOMPATIBILITA: CuproTonic je kompatibilný s väčšinou fungicídov a insekticídov. Neodporúčame miešať so silnými kyselinami a povrchovo aktívnymi látkami.

UPOZORNENIE: Neaplikujte na kvitnúce porasty, stromy, kry a iné rastliny navštevované včelami. Aplikujte vo večerných hodinách po ukončení letu včiel. Použite len v prípade skutočnej potreby. Neprekročte dávkovanie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

POZOR



H302 Škodlivý po požití. **H411** Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované predmety a oblečenie. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

PRVÁ POMOC: **P305+P351+P338** Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P310** Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM alebo lekára.

SKLADOVANIE: Uchovávať v originálnych obaloch v suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovacích potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV: Obaly dobre vypláchnite vodou a odovzdajte ako plastový separovaný odpad.



Číslo šarže:
Objem balenia:
Dátum expirácie:
Uvedené na obale

VÝROBCA:
Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Senkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny
[PFC 1(C)(II)(b)]
Registračné číslo: EU 1191

VÝŽIVA RASTLÍN MIKROŽIVINAMI

OBSAH:

2,2 % oxid horečnatý (MgO), vo vode rozpustný
4,5 % oxid siričitý (SO₂)
0,5 % bóru (B), vo forme kyseliny rozpustnej vo vode
0,4 % medi (Cu), vo forme komplexu s kyselinou glukónovou rozpustného vo vode
1,5 % železa (Fe), vo forme komplexu s kyselinou glukónovou rozpustného vo vode
1,5 % mangánu (Mn), vo forme komplexu s kyselinou glukónovou rozpustného vo vode
0,02 % molybdénu (Mo), vo forme sodnej soli rozpustnej vo vode
1,5 % zinku (Zn), vo forme komplexu s kyselinou glukónovou rozpustného vo vode

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI: pH: 2,5-4,0

ZLOŽKY: Pôvodné látky a zmesi / síran horečnatý (kieserit) CAS č. 14168-73-1, kyselina boritá CAS č. 10043-35-3, glukonát mednatý CAS č. 527-09-3, glukonát železnatý CAS č. 299-29-6, glukonát manganatý CAS č. 6485-39-8, glukonát zinočnatý CAS č. 4468-02-4, molybdénan sodný CAS č. 7631-95-0



NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Dávka	Aplikácia a odporúčané dávky
Vinič a ovocné stromy	1 l/ha 2-3 krát	Fáza rastu listov a tvorby plodov. Fáza nasadzovania plodov a dozrievania. Odporúčané intervaly aplikácie každých 10-15 dní.
Zimná pšenica, Zimný tritikál	1 l/ha 2-4 krát	Jeseň: fáza 3-6 listov. Jar: odnožovanie, prírastok čepele - jednorázová dávka 1 l/ha, voľiteľný termín - fáza vlajkového listu / začiatok klasenia
Jarná pšenica, Jarný tritikál	1 l/ha 2-3 krát	Vývoj listov - odnožovanie, prírastok čepele, voľiteľný termín: fáza vlajkového listu/začiatok klasenia
Zimný krmný jačmeň, Ozimý sladovnícky jačmeň, Zimná raž	1 l/ha 2-4 krát	Jeseň: vývoj listov - do začiatku odnožovania. Jar: začiatok rastu čepele, fáza vlajkového listu/začiatok objavenia sa ušných kostí, voľiteľný termín: koniec kvitnutia - do začiatku mliečnej zrelosti
Jarný krmný jačmeň, Jarný sladovnícky jačmeň, Jarná raž	1 l/ha 2-3 krát	Vývoj listov - do začiatku rastu čepele, fáza vlajkového listu/začiatok objavenia sa ušných kostí, voľiteľný termín: koniec kvitnutia - do začiatku mliečnej zrelosti
Ovos	1 l/ha 2-3 krát	Vývoj listov - odnožovanie, rast čepele - do štádia zástavového listu, voľiteľný termín: koniec kvitnutia - do začiatku mliečnej zrelosti
Zemiaky	1 l/ha 2-3 krát	začiatok rastu výhonkov a listov (výška rastliny cca 10 cm), rast výhonkov a listov (výška rastliny >15 cm), začiatok rastu hlíz
Repka ozimná	1 l/ha 2-4 krát	Jeseň: Fáza 4-8 list. Jar: po obnovení vegetácie / začiatok rastu hlavného výhonku, tvorba pukov - do začiatku kvitnutia, od začiatku opadu okvetných lístkov - do začiatku vývinu šesúľ
Jarná repka	1 l/ha 2-3 krát	Vývoj listov - do začiatku rastu hlavného výhonku, tvorba pukov - do začiatku kvitnutia, od začiatku opadu okvetných lístkov - do začiatku vývinu šesúľ
Horčica	1 l/ha 2-3 krát	Vývoj listov - do začiatku rastu hlavného výhonku, tvorba pukov - do začiatku kvitnutia, od začiatku opadu okvetných lístkov - do začiatku vývinu šesúľ
Slnečnica	1 l/ha 2-3 krát	2-4 listová fáza, začiatok rastu výhonkov.
Ľan	1 l/ha 2-3 krát	rybia kosť, fáza rýchleho rastu, voľiteľný termín: nasadenie kvetných pukov do začiatku kvitnutia
Cukrová repa	1 l/ha 2-4 krát	2-6 rozvinutých listov (optimálne štádium na ošetrovanie je v 4 liste), 7-8 rozvinutých listov, predzrievanie stonky - až do začiatku tvorby bulvy
Sója	1 l/ha 2-4 krát	vývoj prvého pravého listu, začiatok rastu výhonkov, začiatok vývoja kvetných pučikov, začiatok vývoja strukov a semen
Fazuľa	1 l/ha 2-3 krát	vývoj prvého pravého listu, začiatok vývoja kvetných pučikov, voľiteľný termín: začiatok vývoja kvetných pučikov/ začiatok vývoja strukov a semen
Šošovica	1 l/ha 2-3 krát	vývoj prvého pravého listu, začiatok vývoja kvetných pučikov, voľiteľný termín: začiatok rastu výhonkov/ začiatok vývoja strukov a semen
Lúky na kosenie	1 l/ha 2-3 krát	začiatok vegetačného obdobia, po každom kosení alebo spásaní (1-2 týždne pred ďalším spásaním)
Lucerna a datelina	1 l/ha 2-3 krát	začiatok vegetačného obdobia - jednorázová dávka 1 l/ha, po ďalšom kosení, voľiteľný termín: rast výhonkov a listov

