

Mg-Biol

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Uchovávať mimo dosahu detí. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Počas práce s prípravkom nejdzte, nepite, nefajčíte! Všeobecné pokyny: V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce sčervenanie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchnutí: Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: postihnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom.

Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. **Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:** Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. Pri vyhľadani lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (prip. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A KOMPATIBILITA:

Aplikáciu dávku rozmiešajte v malom množstve vody a vlejte do postrekovača naplneného vodou do polovice objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. Najlepšie výsledky sa získajú, ak sa dodrží odporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Nemiešajte s látkami, ktoré majú pH nižšie ako 5. V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním.

SKLADOVANIE:

Uchovávať v originálnych obaloch v suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 4 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV:

Obaly dobre vypláchnite vodou a odovzdajte ako plastový separovaný odpad.

VÝROBCA:

Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Senkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

Číslo šarže:
Objem balenia:
Dátum expirácie:
Uvedené na obale

Základná látka EÚ No. 1107/2009

OCHRANA A VÝŽIVA RASTLÍN

Obsah:

Hydroxid horečnatý (E528) minimálne 98 %

Popis:

Mg-Biol obsahuje hydroxid horečnatý, ktorý je významným zdrojom horčíka pre rastliny, pretože zlepšuje rast, úrodu a kvalitu plodín. Produkt je aj antitranspirant, ktorý indukuje uzatváranie prieduchov a zlepšuje rast a fyziológiu rastlín. Tieto vlastnosti pomáhajú pri odolnosti rastlín voči chorobám. Produkt má bazický charakter a preto sa môže použiť aj na neutralizáciu kyslej pôdy, a pri ochrane rastlín, pretože vytvára pH vyššie ako 8, čo je nevhodné prostredie pre život patogénnych húb.



NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Choroby	Dávka / Voda	Rastová fáza	Aplikácia (interval)
Obilniny: ovos siaty, raž siatá, tritikale, pšenica	septorióza (Septoria sp.)	2,0-5,6 kg/ha / 80-350 l	od začiatku steblovania: hlavné a vedľajšie odnože sú vzpriamené a začínajú sa predzdvíhať, rastový vrchol je vzdialený min. 1 cm od odnožovacieho kolienka (BBCH 30) do stredu kvitnutia, 50 % zrejých tyčiek (BBCH 65)	max. 3 (7 dní)
viník hroznorodý	peronospóra viniča (Plasmopara viticola), múčnatka viniča (Uncinula necator), šera hniloba viniča (Phyllosticta ampellicida, resp. Guignardia bidwellii)	1,0-3,5 kg/ha / 100-800 l	od začiatku vývinu prvého listu (BBCH 10) do máknutia bobúľ (BBCH 85)	max. 1 (-)
rajčiak jedlý, baklažán vajcoplodý, zeleninová paprika, paprika ročná, machovka peruánska, pepino	pleseň zemiakov (Phytophthora infestans)	2,0-5,6 kg/ha / 600-1000 l	od vyvinutého 9. listu na hlavnej stonke (BBCH 19) do vytvoreného 9.bočného výhonku (BBCH 49)	max. 3 (7 dní)
ľuľok zemiakový	pleseň zemiakov (Phytophthora infestans)	1,5-4,2 kg/ha / 300-500 l	od vzhádzania, kľíčky na povrchu pôdy (BBCH 09) do konca tvorby hlúz (BBCH 49)	max. 10 (7 dní)
ruža a okrasné rastliny	múčnatka ruže (Podosphaera pannosa)	1,0-3,5 kg/ha / 600-1200 l	do dosiahnutia konečnej veľkosti vegetatívnych častí rastlín, pred vznikom kvetenstva (< BBCH 49)	max. 2 (7 dní)
kôstkoviny: broskyňa obyčajná, marhúľa obyčajná, čerešňa višňová, slivka domáca, nektárinka, mirabelka	múčnatka broskyňová (Podosphaera pannosa)	1,0-3,5 kg/ha / 600-1200 l	do dosiahnutia konečnej veľkosti vegetatívnych častí rastlín, pred vznikom kvetenstva (< BBCH 49)	max. 2 (4 dni)

