

PLÁN APLIKÁCIE PRÍPRAVKOV A VÝŽIVY VO VINOHRADOCH POČAS VEGETÁCIE

FENOFÁZY VINIČA	MÚČNATKA	BOTRYTÍDA	PERONOSPÓRA	POZNÁMKY
BBCH 01-08 Pučanie listových púčikov	Sírny prípravok + Aquasilikat 0,25%	-	-	Teplota pre sírne prípravky minimálne 15°C !
BBCH 11-19 Vývoj listov	Sírny prípravok + BorOil 0,2-0,3 %	2 x NovaFerm DUAL 3 % (minimum 5-6 listov)	Kontaktný meďnatý prípravok (napr. Kocide 2000)	Výskyt ľadovca: aplikácia Aquasilikat 0,3 %
BBCH 53-57 Vývoj kvetenstva	alebo Folicit 0,4 % + BorOil 0,2 %		Imunofol 0,2 %* + CuproTonic 0,2 % alebo Profidol-PK 0,2 % + CuproTonic 0,2 %	Výživa: Bór, Meď, Zinok prípadne Fosfor a Draslík *Upraviť pH vody pod 4 s PuferMix 0,1%
BBCH 60-69 Kvitnutie	Nestriekame	(Chitopron* 0,3 % + CuproTonic 0,2 %)**		**Len v prípade dlhého kvitnutia alebo daždiveho počasia.
BBCH 71-79 Vývoj bobúľ a strapcov	PowerOf-K 0,8 % + FerrumOil 0,2-0,3 % alebo Folicit 0,5 %***	PowerOf-K 0,8 % + FerrumOil 0,2-0,3 %	CuproTonic 0,2 %**** prípadne (NovaFerm SIRIUS 2 %)	Výživa: Meď, Zinok, Železo, Horčík a Draslík ***Vysoký tlak múčnatka: Folicit 0,4 % + PowerOf-K 0,6 %
BBCH 81-89 Dozrievanie bobúľ	PowerOf-K 0,8 % + BorOil 0,2-0,3 % prípadne (NovaFerm SIRIUS 2 %)			****Vysoký tlak peronospora: CuproTonic 0,4 %
<p>Postrek kombinácia múčnatka + peronospora: Folicit 0,4 % + CuproTonic 0,2 % + Profidol-PK 0,2 %</p> <p>Múčnatka kuratívne: Profivital 0,6 %</p> <p>Peronospora kuratívne: Profidol-PK 0,3 % + CuproTonic 0,2 %</p>				